

## ВНИМАНИЕ! АНТРАКНОЗ ЗЕМЛЯНИКИ



**Антракноз земляники** – опасное карантинное заболевание земляники, внесенное в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, как отсутствующий вид на территории Евразийского экономического союза. Это заболевание вызывают грибы *Colletotrichum acutatum Simmonds*.

**Распространение.** Антракноз или черная пятнистость земляники распространена по всему миру. Самые близкие места его дислокации – Болгария, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Китай и Турция. В Российской Федерации антракноз земляники выявлялся в 2009 году на полях Краснодарского края, с ввезенным посадочным материалом из Италии. В настоящее время данный карантинный объект является отсутствующим на территории Российской Федерации.

Краснодарский и Ставропольский край, Тамбовская, Ростовская, Воронежская и Липецкая области – это зоны наиболее вероятного заболевания растений.

**Симптомы повреждений.** На усиках и верхней части черешков, на которых развернулись новые листья, появляются продолговатые вдавленные язвочки. Сначала они мелкие, красно-бурые, а потом чернеют. Постепенно язвочки образуют кольцо вокруг усика или черешка, и те засыхают. На листьях много пятнышек размером до 2 мм: они сначала светло-бурые, а позже становятся черными. Со временем пятнышки тоже сливаются в большие пятна, и лист гибнет. На незрелых ягодах: одно или несколько вдавленных пятен, их цвет - от темных бурых до черных, диаметром до 3 мм. Когда ягода засохнет, бурый цвет получит шоколадный оттенок. На зрелых ягодах: вдавленные пятна с четко очерченным краем, буро-бронзовые; позже пятна чернеют, а гниль становится сухой и твердой.

**Вредоносность.** Потери урожая земляники садовой достигают 80 %, а выпады растений в маточных насаждениях – 33 % и более. На одном из полей в фермерском хозяйстве Белореченского района Краснодарского края погиб весь урожай на площади два гектара. Болезнь опасна тем, что после заражения растений может длительное время никак себя не проявлять.

**Пути распространения.** Возбудитель передаётся с заражённым посадочным материалом. В поле основным источником инфекции являются заражённые растительные остатки и мумифицированные ягоды. Споры распространяются с водой, ветром, насекомыми.

**Фитосанитарные карантинные меры.** Не использовать посадочный материал, ввезенный из других стран, а закладывать плантации только из здорового посадочного материала, приобретенного у проверенных поставщиков. Перед посадкой можно погружать саженцы на полчаса в раствор фунгицида, в соответствии со «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для использования на территории Российской Федерации».

**Если заметили на своей грядке подозрительные растения, а происхождение саженцев вам неизвестно, можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Павловский МО ВФН по тел. 8 (861-91) 3-16-11**